

Enfermedad del ojo por la sífilis en el Condado de King

Aviso de Salud Pública para hombres gay y bisexuales

Se han identificado seis casos de sífilis ocular en el estado de Washington desde mediados de diciembre del 2014. Cuatro de estos casos, se diagnosticaron en el Condado de King, incluyendo tres casos en hombres gay y bisexuales. Dos de estos casos resultaron en ceguera permanente. De los casos en el Condado de King, tres también tienen el VIH.

La enfermedad del ojo a causa de la sífilis no es común, pero es una complicación que puede ocurrir en las etapas tempranas como también en las etapas tardías de la infección. El tratamiento temprano puede curar la sífilis y evitar daño permanente.

Los síntomas iniciales de sífilis ocular pueden ser sutiles. Pueden incluir:

- *visión borrosa*
- *motas (manchitas que flotan en su visión)*
- *un tinte azul en su visión*
- *parpadeo*
- *dolor de ojo*

*Si no se los tratan, estos síntomas pueden avanzar a pérdida de la visión. **Con tratamiento temprano, usualmente estos síntomas desaparecen.** Un tratamiento tardío puede resultar en ceguera permanente.*

Qué hacer:

Los hombres gay y bisexuales que están activos sexualmente y no tienen relaciones mutuamente monógamas deben:

- Usar condones y limitar el número de parejas sexuales.
- Tener en cuenta los síntomas de sífilis y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Aprenda más en kingcounty.gov/health/std.
- Hágase la prueba de sífilis si tiene cualquiera de los problemas de visión descritos arriba.
- Hágase la prueba de ITS – incluso de sífilis y VIH – por lo menos una vez al año. Hágase las pruebas cada tres meses si cualquiera de lo siguiente aplica para usted el año pasado:
 - ⇒ tuvo 10 o más parejas sexuales
 - ⇒ tuvo sexo anal sin protección con una pareja cuyo estado del VIH es positivo o desconocido
 - ⇒ usó poppers
 - ⇒ usó metanfetaminas
 - ⇒ tuvo gonorrea, clamidia, o sífilis
- Considere tomar PrEP (profilaxis previa a la exposición) para el VIH, especialmente si cualquiera de las actividades se aplican para usted. PrEP puede protegerle del VIH, pero no de la sífilis.

Un pinchazo de antibióticos usualmente curará la sífilis.

No espere. Hágase la prueba. Busque curarse.

Salud Pública 
Seattle y el condado de King
Clinica de ETS en Harborview
908 Jefferson St., 11° piso

SÍFILIS – Fácil de adquirir. Fácil de curar.

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria *Treponema pallidum*. Es fácil no darse cuenta de los síntomas, y es fácil confundirlos con algo diferente. Aunque no note los síntomas, todavía puede estar infectado. Cada etapa de sífilis se presenta de forma diferente.

La sífilis primaria se presenta como una llaga abierta y elevada en los genitales, la boca, o el recto. Es fácil no darse cuenta de la llaga porque no es dolorosa. Usualmente aparece 1-3 semanas después de infectarse, aunque a veces puede tomar meses. La llaga puede durar varias semanas y desaparecer por sí sola. Pero la sífilis no ha desaparecido. **Los problemas con los ojos pueden empezar en esta etapa.**

La sífilis secundaria usualmente empieza con un sarpullido con manchas marrones rojizas en una o más áreas del cuerpo. Lo más común es que el sarpullido aparece en las palmas de las manos o las plantas de los pies, pero puede aparecer en otras áreas también. Usualmente no pica y puede ser muy sutil. El sarpullido puede aparecer y desaparecer por hasta 2 años. Otros síntomas pueden incluir nódulos linfáticos hinchados, fiebre, fatiga, pérdida del cabello en parches, pérdida de peso, y dolor de cabeza. **Los problemas con los ojos y la visión también pueden pasar en esta etapa.**

La sífilis latente empieza cuando los síntomas secundarios desaparecen. Durante esta etapa no hay ninguna señal de síntomas. Sólo se puede detectar la infección por una prueba de sangre. Una recaída a sífilis secundaria, puede ocurrir durante los primeros años de latencia.

La sífilis tardía o en etapa terciaria. Cerca de una tercera parte de las personas que no son tratadas sufre serios daños en el cerebro, sistema nervioso, corazón u otros órganos. La sífilis terciaria puede causar parálisis, demencia, **ceguera**, sordera, fallas del corazón y hasta la muerte. El tratamiento en esta etapa curará la enfermedad y detendrá más daño en el futuro. Pero no puede reparar ni revertir, el daño que ya haya causado.

Aprenda más sobre la sífilis en:
SyphilisInSeattle.com (inglés) o
cdc.gov/std/spanish/sifilis/ (español)